

# 総合プログラム : 種豚用

(L:生ワクチン、K:不活化ワクチン、W:週、M:月)

ワクチン [注射量]	ワクチン接種時期(種付後週数)																				
	種豚候補豚	種付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	分娩			
TGE(L-K法) [L: 1mL] [K: 1mL]			L 0-6W											7-14W					K	約2W	
PED(L) [2mL]														① 6-12W				2-8W		②	約2W
TGE・PED(L) [2mL]														① 6-10W			4-8W			②	約2W
ARBP(K) [5mL] BP-SER BP-SER(K) [5mL]	初産	① 7-8カ月												② 4-8W		1-2M		③	1M		
	経産	ARBP												① 4-8W		1-2M		②	1M		
																		①	1M		
ARBP・ME	初産	① 7-8カ月												② 4-10W		1-2M		③		2W-4W	
	経産																	①		2W-4W	
GL2(K) [1mL]		① 2-4W	② 出荷前あるいは移動前1~2週																		
SE(L) [1mL]		① 必要に応じ、1カ月後		② 以降半年毎補強接種(各繁殖サイクル毎)																	③
SE(K) [1mL]		① 3-5W		② 以降半年毎補強接種(各繁殖サイクル毎)																	③

ワクチン [注射量]	ワクチン注射時期(月)(①第1回、②第2回)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
JE(LK法) [L: 1mL] [K: 2mL]					①		以降毎年同時期にKを1回注射																
	1カ月後				②		※流行期には種付の1カ月前までに注射を終わりましょう																
JE(LL法) [L: 1mL]					①		以降毎年同時期に接種																
	必要に応じ1カ月後				②																		

①: 第1回注射、②: 第2回注射、③: 第3回注射