

# 日生研製品を用いた鶏用総合ワクチネーションプログラムの例

■ : 生ワクチン

■ : 不活化ワクチン

## レイヤー（コマーシャル）

日齢								
0 ~ 7	14 ~ 21	28 ~ 42	50 ~ 60	70 ~ 90		100 ~ 120		
S95-IB or C-78 散霧 飲水	S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水	S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水 噴霧	CBL 噴霧	NBBAC 筋肉内	CBL 噴霧 散霧	NBBAC 筋肉内	S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水 噴霧	AEL 経口 飲水
	NBL 飲水		S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水 噴霧	EDS or EDSWO 筋肉内	FPL 翼膜 穿刺	EDS or EDSWO 筋肉内		
TAM 混餌 散霧	FPL 翼膜 穿刺	NBL 飲水 噴霧		MGN 筋肉内	ILTL 点眼	MGN 筋肉内	NBL 飲水 噴霧	
	IBDL 飲水	ILTL 点眼						
Neca 混餌								

**【注意】**  
NDL、NBL、S95-IB、C-78、MI-IB、ILTLはワクチンウイルス間で干渉作用がみられることがありますので、1~2週間以上の間隔をあけて接種して下さい。

## ブロイラー（コマーシャル）

日齢			
0 ~ 7	10	14 ~ 21	28 ~ 35
S95-IB or C-78 散霧 飲水	S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水	ILTL 点眼	S95-IB or C-78 or MI-IB 飲水 噴霧
FPL 翼膜 穿刺	NBL 飲水	CBL 噴霧 散霧	NBL 飲水 噴霧
CBL 噴霧	IBDL 飲水		
TAM 混餌 散霧			
Neca 混餌			