

日生研鶏コクシ弱毒 3 価生ワクチン (TAM)

日生研鶏コクシ弱毒生ワクチン (Neca)

推奨ワクチン接種プログラム

		初生	3	4	5	6	7	8	9	10		28日齢	
TAM単独	散霧投与	—○—											
	飼料混合投与	—○—											
Neca単独	飼料混合投与	—○—											
TAM・Neca 併用		TAM(飼料混合投与)					Neca(飼料混合投与)						
		—○—		—○—		—○—		—○—		—○—		—○—	

TAM：日生研鶏コクシ弱毒 3 価生ワクチン

Neca：日生研鶏コクシ弱毒性ワクチン

<病気の好発時期>

テネラ、アッセルブリーナ、マキシマ：3～7 週齢

ネカトリックス：8 週齢～成鶏

飼料混合投与 投与の手順

投与の 3～4 時間前から断餌しておいてください

用意するもの

- (1) ワクチン羽数分 (ワクチン 1 本 =1,000 羽分)
- (2) 水 (水道水で可)
- (3) 飼料 (抗コクシジウム剤の入っていないもの) 1 日の摂取量の約 1 割
- (4) はかり (飼料を量る)
- (5) 計量カップ (1 リットルくらいのもの)
- (6) ビニール袋 (45×60cm くらいの厚手のもの)
- (7) ビニールシート (3cm×3cm くらい) またはコンテナ (2 次混合、3 次混合に使用)
- (8) 飼料皿 1,000 羽のブルーダーに 8 個 (1 個 /130 羽) 程度

投与の手順 10,000羽の場合

