

総合プログラム：肥育豚用

(L:生ワクチン、K:不活化ワクチン、W:週、M:月)

| ワクチン [注射量] | ワクチン注射時期(週齢) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ARB(K) [1mL] BP-SER(K) [1mL] | 3~5W 非免疫母豚由来 ① 3-5W ② 6-10W 免疫母豚由来 ① 7-10W ② 10-15W | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ AP125RX (K) [1mL] | ① 5-12W ② 8-15W 3~5W | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ MPS(K) [1mL] | ① 3-10W ② 6-13W 3~5W | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ APM(K) [2mL] | ① 3-12W ② 8-15W 3~5W | | | | | | | | | | | | | | |
| GL2(K) [1mL] | ① 2~4W ② 病気の好発時期の2週間以上前 | | | | | | | | | | | | | | |
| SE(L) [1mL] | 必要に応じ1ヵ月後 ② 4.5-8.5W ② 8.5-12.5W | | | | | | | | | | | | | | |
| SE(K) [1mL] | 約1ヵ月 ② 5-9W ② 9-13W (急性方発生農場での緊急対応:3W間隔) | | | | | | | | | | | | | | |

①:第1回注射、②:第2回注射

※印の付いたワクチンの、適切な注射時期は抗体検査の成績をもとに策定することをお勧めします。